

Metafen rozkurczowy 40 tabletek

Cena: 32,44 pln



Opis słownikowy

Dawka	40 mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	40 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Drotaverinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Lek Metafen rozkurczowy zawiera jako substancję czynną chlorowoderek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego. Działa przynosząc ulgę w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, dróg żółciowych, układu moczowego i przewodu pokarmowego. **Skład** Substancją czynną jest drotaweryny chlorowoderek (Drotaverini hydrochloridum). Każda tabletkę zawiera 40 mg chlorowodoru drotaweryny. Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie doustne. Dorośli: 120 mg do 240 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg. Dzieci: W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego Metafen rozkurczowy u dzieci: - dawka dobową dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych - dawka dobową dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 10 dni. **Działanie** Substancja czynna leku - drotaweryna jest syntetyczną pochodną papaweryny. Lek wykazuje działanie rozkurczowe (spazmolityczne) na mięśnie gładkie. Działanie leku szczególnie wyraźnie zaznacza się w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, dróg żółciowych, układu moczowego, przewodu pokarmowego oraz układu krążenia. **Wskazania** Metafen Rozkurczowy stosuje się w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami: dróg żółciowych (kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego); dróg moczowych (kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz). Wspomagająco jest wykorzystywany w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaporciach spastycznych i wzdęciach jelit oraz w bolesnym miesiączkowaniu. **Przeciwwskazania** Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek i blokiem przedsionkowo-komorowym II-III stopnia. **Ostrzeżenia i środki ostrożności** Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Metafen Rozkurczowy: u pacjentów z porfirią; z niedociśnieniem; u dzieci, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących działania drotaweryny w tej grupie; u kobiet w ciąży. Nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu. Lek należy przechowywać w miejscu suchym, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi lewodopę zmniejsza skuteczność ich działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności. **Ciąża i karmienie piersią** Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie stosować leku w czasie porodu i w okresie karmienia piersią. **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży** Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn** W przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy zachować ostrożność.