

## Dynid Gem 5 mg 10 tabletek

Cena: 15,99 pln



### Opis słownikowy

Dawka	5 mg
Kraj produkcji	Czechy
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.
Producent/ Dystrybutor	GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Czym jest Dynid Gem?** Dynid Gem jest lekiem zawierającym jako substancję czynną desloratadynę w dawce 5 mg w każdej tabletkę. Lek Dynid Gem stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką. Produkt leczniczy Dynid Gem jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej. **Jakie sa wskazania do stosowanie leku Dynid Gem?** Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Substancja czynna: Desloratadinum. Skład tabletek Dynid Gem 5 mg. Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletkę Dynid Gem zawiera 5 mg desloratadyny. Pozostałe składniki leku: celuloza mikrokrystaliczna (typ 112); laktoza jednowodna; skrobia kukurydziana; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian. **Jak dawkować tabletkę Dynid Gem?** Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka produktu leczniczego Dynid Gem to jedna tabletkę raz na dobę. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Lek Dynid Gem należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Dynid Gem - przeciwwskazania** Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę. Zawartość: Opakowanie leku Dynid Gem 5 mg zawiera 30 tabletek oraz ulotkę. Sposób przechowywania: 15°C - 25°C. Producent / Podmiot odpowiedzialny: GLENMARK