


## Dicopeg Liquid płyn 10 saszetek



Cena: 38,11 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 sasz.
Postać	płyn
Producent/ Dystrybutor	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Czym jest Dicopeg Liquid i jakie ma działanie?**Dicopeg Liquid jest wyrobem medycznym do stosowania doustnego, wskazanym do objawowego leczenia zaparcia.Dzięki zawartości makrogolu 3350, preparat pobudza perystaltykę, wspomaga regularne wypróżnianie i w ten sposób zapobiega zaparciom oraz tworzeniu się zbitych mas kałowych.Produkt Dicopeg Liquid przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia ora osób dorosłych.**Działanie**Preparat Dicopeg Liquid pobudza perystaltykę, wspomaga regularne wypróżnianie i w ten sposób zapobiega zaparciom oraz tworzeniu się zbitych mas kałowych.**Składniki**Składniki: woda oczyszczona, makrogol, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, benzoesan sodu, sukraloza. Nie zawiera glutenu.**Jak stosować Dicopeg Liquid?**Aby uregulować wydalanie miękkiego stolca, dawki należy zwiększać lub zmniejszać, w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Jeżeli pacjent nie zauważy poprawy po 7 dniach leczenia, powinien skonsultować się z lekarzem.Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:od 2 do 8 saszetek dziennie.Maksymalna skuteczna dawka zwykle nie przekracza 8 saszetek dziennie.Roztwór doustny należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produktu należy wypić około 60 ml wody na każdą saszetkę.Jeżeli ma być przyjęta minimalna dawka (2 saszetki dziennie), zaleca się przyjęcie jej rano.W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.Dzieci w wieku od 6. miesięcy do 12 lat:od 6 do 10 kg: 1 saszetka dziennie;od 10 do 15 kg: 1-2 saszetki dziennie;od 16 do 20 kg: 2-3 saszetki dziennie;od 21 do 43 kg: 3-4 saszetki dziennie.Maksymalna skuteczna dawka zwykle nie przekracza 4 saszetek dziennie. Roztwór doustny należy przyjmować w postaci, w jakiej jest zawarty w saszetce. Po zażyciu produktu należy wypić około 60 ml wody na każdą saszetkę.Jeżeli ma być przyjęta minimalna dawka (1 saszetka dziennie), zaleca się przyjęcie jej rano.W przypadku większych dawek, należy je podzielić na porcje przyjmowane rano i wieczorem.**Ostrzeżenia**Chronić przed dziećmi i przechowywać w miejscu niewidocznym dla dzieci.Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.Zaleca się, aby u dzieci produkt stosować po konsultacji z lekarzem. Podawanie dzieciom powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.Przed stosowaniem w czasie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.Nie stosować po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu.Nie stosować, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.Produkt może skracać czas pasażu jelitowego i tym samym wchłanianie leków stosowanych doustnie. W związku z tym, wskazane jest, aby skonsultować się z lekarzem w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków doustnych, które w każdym przypadku muszą być podawane w odstępie co najmniej 2 godzin od przyjęcia dawki Dicopleg Liquid. W przypadku działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.