PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Ibum Supermax 600 mg 10 kapsułek

Cena: 17,14 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,6 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	kapsułki
Producent/ Dystrybutor	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Czym jest Ibum Supermax i jakie ma działanie?Ibum Supermax to silny lek na ostry ból - zawiera najwyższą dostępną na polskim rynku leków bez recepty dawkę ibuprofenu w postaci miękkiej kapsułki – aż 600 mg. Miękka żelatynowa kapsułka ulega rozpadowi w żołądku, uwalniając gotowy do wchłonięcia lek.Lek Ibum Supermax działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe.Ibum Supermax to:Jedyna na rynku kapsułka z dawką 600 mg ibuprofenu dostępna bez recepty. Odpowiedź na ostry ból – do doraźnego, krótkotrwałego stosowania u dorosłych w ostrych i umiarkowanych bólach różnego pochodzenia.Płynna postać ibuprofenu – kapsułka zawiera ibuprofen w płynnej, rozpuszczonej i gotowej do wchłaniania formie.Miękka kapsułka, łatwa do połknięcia.**Wskazania do stosowania kapsułek Ibum Supermax**Ibum Supermax to lek na ból do krótkotrwałego, doraźnego stosowania w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia:bóle zębówbóle głowy (w tym również migreny)bóle mięśni i kości (w tym także bóle pleców)bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznymbolesne miesiączkowanienerwobóle.Substancja czynna: Ibuprofenum**Ibum Supermax - skład kapsułki**Substancją czynną leku Ibum Supermax jest ibuprofen. Jedna kapsułka zawiera 600 mg ibuprofenu.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy (E 131).**Jak stosować i dawkować kapsułki Ibum Supermax?**Ibum Supermax jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.Dorośli:Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 kapsułka) jednorazowo.W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 kapsułka) można powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin.Maksymalna dawka to 1200 mg ibuprofenu (2 kapsułki) na dobę. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni lub ulegną nasileniu, zalecana jest konsultacja z lekarzem.Lek Ibum Supermax należy stosować tylko w przypadku, gdy pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/dobę). W takim przypadku dawkę 600 mg można zastosować uwzględniając odstęp 6-8 godzinny od przyjęcia dawki 400 mg.Osoby w podeszłym wieku, a także pacjenci, cierpiący na niewydolność nerek lub wątroby nie powinni stosować leku Ibum Supermax bez konsultacji z lekarzem.Pokarm zmniejsza wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego.**Kiedy nie należy stosować Ibum Supermax?**Ibum Supermax jest przeciwwskazany:jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);u pacjentów, u których w trakcie terapii lekami z grupy NLPZ

występowały jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej;jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie;u pacjentów ze skazą krwotoczną;u pacjentów znacznie odwodnionych;w ostatnich 3 miesiącach ciąży;u pacjentów poniżej 18 lat.