

Oftahist 1mg/ml krople do oczu 5ml

Cena: 43,53 pln



Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 but.a 5ml
Postać	krople do oczu
Producent/ Dystrybutor	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Olopatadinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Krople do oczu Oftahist są przeznaczone do leczenia podmiotowych i przedmiotowych objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, a także obrzękiem powierzchni oka. **Wskazania** Leczenie ocznych objawów przedmiotowych i podmiotowych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. **Substancja czynna** Olopatadinum **Skład** Jeden ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci chlorowodoru). Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy 0,1 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. **Dawkowanie** Preparat Oftahist podaje się po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę (z zachowaniem 8 godzin przerwy pomiędzy zakropieniem kolejnych dawek). O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce, należy postępować ostrożnie, by nie dotknąć końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni. Gdy preparat nie jest używany, butelkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą. W przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami okulistywnymi podawanymi miejscowo, należy zachować pięć do dziesięciu minut przerwy pomiędzy podaniem kolejnych leków. **Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku** Nie ma potrzeby wprowadzania zmian dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. **Stosowanie u dzieci** Oftahist może być stosowany u pacjentów pediatrycznych (w wieku trzech lat i starszych) w takiej samej dawce jak u dorosłych. **Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek** Olopatadyny w postaci kropli do oczu (preparatu Oftahist) nie badano u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby. Nie należy jednak spodziewać się, aby u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby istniała konieczność zmiany dawkowania (patrz punkt 5.2). **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Uwagi do stosowania** Oftahist zawiera benzalkoniowy chlorek. Środek może powodować alergiczne podrażnienie skóry. Nie stosować przy założonych miękkich soczewkach kontaktowych. Po zakropieniu leku należy odczekać 10-15 minut i dopiero potem założyć soczewki. Może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.