

Paracetamol Synoptis 500 mg 50 tabletek

Cena: 11,29 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabl.
Producent/ Dystrybutor	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Paracetamol Synoptis - opis i zastosowanie Paracetamol Synoptis zawiera jako substancję czynną paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych zwanych analgetykami. Lek Paracetamol Synoptis jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu oraz obniżania gorączki. **Kiedy wskazany jest Paracetamol Synoptis?** w objawach grypopodobnych, gorączce (trwającej krócej niż 3 dni), ciężkich reakcjach po podaniu szczepionki (reakcje hiperegergiczne), łagodnych i umiarkowanych bólach głowy, łagodnych do umiarkowanych migrenach u pacjentów ze zdiagnozowaną migreną, łagodnych do umiarkowanych bólach zębów, łagodnych do umiarkowanych bólach uszu, łagodnych do umiarkowanych bólach miesiączkowych, łagodnych do umiarkowanych bólach pourazowych, mięśni i stawów. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Substancja czynna: Paracetamolum **Skład** Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletki zawiera 500 mg paracetamolu. Pozostałe składniki to: powidon K30, skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy (typ 50). **Jak dawkować Paracetamol Synoptis?** Zalecana dawka zależy od wieku i masy ciała. Paracetamol Synoptis jest przeznaczony do stosowania doustnego u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i powyżej. Odstępy między dawkami powinny wynosić 6 do 8 godzin. W razie konieczności odstępy mogą wynosić co najmniej 4 godziny. Nie należy przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Maksymalna dawka dobowy paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę. Paracetamol (acetaminofen) jest powszechnym składnikiem wielu produktów leczniczych złożonych. Należy to wziąć pod uwagę w celu uniknięcia przekroczenia maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Czas trwania leczenia: Nie należy przyjmować leku Paracetamol Synoptis w dużych dawkach, chyba że podano inaczej. Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. Sposób i droga podania Paracetamol Synoptis 500 mg: Lek Paracetamol Synoptis należy podawać doustnie. Tabletki można przyjmować w całości lub rozkruszyć i zmieszać z wodą. Przyjmowanie po posiłku może opóźnić działanie. Paracetamol Synoptis z jedzeniem i pić: W trakcie przyjmowania leku Paracetamol Synoptis nie należy spożywać alkoholu. Alkohol może powodować zwiększenie toksycznego działania paracetamolu na wątrobę. **Stosowanie Paracetamol Synoptis u dzieci** Paracetamol Synoptis nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat i masy ciała poniżej 40 kg ze względu na ilość paracetamolu. Dostępne są inne moce i postaci paracetamolu bardziej odpowiednie dla tej grupy pacjentów. **Kiedy nie przyjmować leku Paracetamol Synoptis?** Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, Maksymalna dawka dobowy Paracetamolu Synoptis: Maksymalna dawka dobowy paracetamolu nie

powinna przekraczać 3 g na dobę. Paracetamol (acetaminofen) jest powszechnym składnikiem wielu produktów leczniczych złożonych. Należy to wziąć pod uwagę w celu uniknięcia przekroczenia maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Czas trwania leczenia: Nie należy przyjmować leku Paracetamol Synoptis w dużych dawkach, chyba że podano inaczej. Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. Sposób i droga podania Paracetamol Synoptis 500 mg: Lek Paracetamol Synoptis należy podawać doustnie. Tabletki można przyjmować w całości lub rozkruszyć i zmieszać z wodą. Przyjmowanie po posiłku może opóźnić działanie. Paracetamol Synoptis z jedzeniem i pić: W trakcie przyjmowania leku Paracetamol Synoptis nie należy spożywać alkoholu. Alkohol może powodować zwiększenie toksycznego działania paracetamolu na wątrobę. Stosowanie Paracetamol Synoptis u dzieci Paracetamol Synoptis nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat i masie ciała poniżej 40 kg ze względu na ilość paracetamolu. Dostępne są inne moce i postacie paracetamolu bardziej odpowiednie dla tej grupy pacjentów. Kiedy nie przyjmować leku Paracetamol Synoptis? Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, Maksymalna dawka dobowe Paracetamolu Synoptis: Maksymalna dawka dobowe paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę. Paracetamol (acetaminofen) jest powszechnym składnikiem wielu produktów leczniczych złożonych. Należy to wziąć pod uwagę w celu uniknięcia przekroczenia maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Czas trwania leczenia: Nie należy przyjmować leku Paracetamol Synoptis w dużych dawkach, chyba że podano inaczej. Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. Sposób i droga podania Paracetamol Synoptis 500 mg: Lek Paracetamol Synoptis należy podawać doustnie. Tabletki można przyjmować w całości lub rozkruszyć i zmieszać z wodą. Przyjmowanie po posiłku może opóźnić działanie. Paracetamol Synoptis z jedzeniem i pić: W trakcie przyjmowania leku Paracetamol Synoptis nie należy spożywać alkoholu. Alkohol może powodować zwiększenie toksycznego działania paracetamolu na wątrobę. Stosowanie Paracetamol Synoptis u dzieci Paracetamol Synoptis nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat i masie ciała poniżej 40 kg ze względu na ilość paracetamolu. Dostępne są inne moce i postacie paracetamolu bardziej odpowiednie dla tej grupy pacjentów. Kiedy nie przyjmować leku Paracetamol Synoptis? Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol.