

# Prospan 0,026 g 20 pastylek

Cena: 31,62 pln



## Opis słownikowy

Dawka	0,026 g
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	20 szt.
Postać	pastyl.miękkie
Producent/ Dystrybutor	ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Hederae helicis folii extractum siccum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

Lek Prospan jest lekiem roślinnym zawierającym wyciąg z liści bluszczu stosowanym jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu (tzw. mokrym kaszlu). Lek ten należy do grupy leków wykrztuśnych stosowanych, aby wspomóc usuwanie śluzu i flegmy z dróg oddechowych, przynosząc w rezultacie ulgę w produktywnym kaszlu (tzw. mokrym kaszlu).

### Wskazania

Kaszel produktywny (kaszel mokry)

Substancja czynna: Hederae folium

1 pastylka miękka zawiera 0,53 g maltitolu i 0,53 g sorbitolu, co odpowiada około 0,09 jednostki chlebowej.  
Wartość kaloryczna 1 pastylki: 2,6 kcal = 10,6 kJ.

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

należy ssać 1 pastylkę 4 razy na dobę (co odpowiada 104 mg suchego wyciągu z liści bluszczu na dobę).

Maksymalna dawka dobową leku wynosi 105 mg.

Dobowa dawka nie może przekraczać 4 pastylek na dobę (co odpowiada 104 mg suchego wyciągu z liści bluszczu).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

należy ssać 1 pastylkę 2 razy na dobę (co odpowiada 52 mg suchego wyciągu z liści bluszczu).

Maksymalna dawka dobową leku wynosi 70 mg.

Sposób stosowania:

Do podawania doustnego, do ssania.

Pozostawić pastylki w ustach do rozpuszczenia. Przyjmować po posiłkach (nie przyjmować w pozycji leżącej).

Czas leczenia:

Okres leczenia jest uzależniony od typu objawów i stopnia ich zaawansowania, na ogół, leczenie powinno trwać przez około 1 tydzień.

Jednakże, jeżeli pomimo stosowania leku dłużej niż 1 tydzień dolegliwości utrzymują się, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej lub pojawiają się takie objawy jak duszności, gorączka, ropne lub krwawe odkrztuszanie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Prospan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek Prospan nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na inne rośliny z rodziny Araliaceae (araliowate) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.