

Ibutact 40 mg/ml zawiesina doustna 200 ml



Cena: 36,99 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Dawka | 0,04 g/ml |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 200ml |
| Postać | zawiesina do ustna |
| Producent/ Dystrybutor | TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Ibuprofenum |
| Wsyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Lek Ibutact zawiera substancję czynną ibuprofen należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. **Wskazania** Wskazaniami do stosowania leku są: gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia a także w przebiegu odczynu poszczepiennego; bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: ból głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Ibutact jest wskazany dla dzieci o masie ciała powyżej 5 kg (w wieku powyżej 3 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych. **Substancja czynna:** ibuprofenum **Skład** Substancja czynna Substancją czynną leku jest ibuprofen. 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu. Pozostałe składniki: glikol propylenowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoatan (E 211), sacharyna sodowa, sodu cytrynian, sorbitol ciekły niekryształujący, glicerol, guma ksantyn, polisorbat 80, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy. **Zawartość** 200 ml **Sposób przechowywania** 25°C