


Itami 140 mg 10 plastrów



Cena: 82,72 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,14 g
Kraj produkcji	Włochy
Opakowanie	10 plastrów
Postać	plaster leczniczy
Producent/ Dystrybutor	Fidia Farmaceutici S.p.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Diclofenacum natricum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład 1 plaster leczniczy zawiera 140 mg soli sodowej diklofenaku. **Wskazania** Plastry przeznaczone są do leczenia miejscowe, krótkotrwałego i objawowego bólu u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. Preparat jest przeznaczony do leczenia krótkotrwałego (nie dłużej niż 7 dni). **Działanie** ITAMI plastry zawierają 140 mg diklofenaku o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, należącym do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i stan zapalny. **Dawkowanie** Zewnętrznie. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster na bolący obszar 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowo to 2 plastry, nawet jeśli leczone ma być więcej niż jedno miejsce chorobowe. Oznacza to, że w danym czasie leczony może być wyłącznie tylko jeden obszar ciała. Preparat jest przewidziany do stosowania w leczeniu krótkotrwałym. Okres stosowania leku nie powinien przekraczać 7 dni. Nie wykazano korzyści terapeutycznych płynących z dłuższego stosowania preparatu. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w trakcie zalecanego okresu leczenia nie nastąpi poprawa, lub nastąpi nasilenie objawów. Lek stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, zależnie od wskazania. Preparat należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę i nie powinien on pozostawać na skórze pacjenta podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Plastra nie należy dzielić. Jeśli to konieczne, plaster można przymocować za pomocą dzianego bandaża. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.