PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Diabetofort płyn doustny 100 g

Cena: 33,29 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	100 g
Postać	płyn doustny
Producent/ Dystrybutor	TADEUSZ POLAŃSKI PRZEDSIĘB.FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY"
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Nazwa: Diabetofort
Postać: płyn doustny
Dawka: -
Opakowanie: 100 g
Skład:

100g leku zawiera:

Owocnia fasoli (Phaseoli pericarpium) - 30,0g, Liść brzozy (Betulae folium) - 20,0g,Kłącze perzu (Agropyri rhizoma) - 20,0g,Liść jeżyny fałdowanej (Rubi fruticosi folium) - 20,0g,Owoc róży (Rosae fructus) -10,0g.

Zawartość etanolu: 60-70% (v/v)

Rodzaj i zawartość opakowania: Butelka - 100g.

Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w zaburzeniach w oddawaniu moczu. W porozumieniu z lekarzem preparat może być stosowany przez osoby z rodzinną predyspozycją do cukrzycy jako wspomagający środek moczopędny, zmniejszający tendencję do wzrostu cukru po posiłku (w przypadkowej hiperglikemii).

:

Nie należy stosować leku DIABETOFORT
Jeśli u pacjenta występuje obrzęki wywołane niewydolnością serca lub nerek. Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek Jeśli u pacjenta wystepuje alkoholizm, padaczka, uszkodzenia mózgu lub choroby umysłowe Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku Nie należy stosować leku przez dłuższy czas. Jeżeli objawy nasilą się, lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek DIABETOFORT może powodować działania niepożądane. U osób wrażliwych na wysokie zawartości tanoidów mogą wystąpić nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 5 ml leku, do 4 razy na dobę. Odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć małą ilością wody. Do opakowania dołączony jest kieliszek z podziałką do dozowania leku.

Stosowanie leku DIABETOFORT u dzieci:
Leku DIABETOFORT nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na zawartość etanolu (alkoholu etylowego) - 60-70% (v/v).

Środki ostrożności:

Ponieważ produkt leczniczy zawiera roślinne substancje biologicznie czynne, zwane tanoidami, długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń czynności wątroby. Stąd też należy stosować możliwie krótkotrwale.

Stosowanie leku DIABETOFORT z jedzeniem i piciem

W czasie terapii lekiem DIABETOFORT należy pić dużo płynów, lek należy przyjmować po posiłku.

Prowadzenie pojazdów:

W zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę maszyn.

Ciąża:

Ciąża i karmienie piersią:
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.