

Acard 150 mg 30 tabletek dojelitowych



Cena: 18,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,15 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki dojelitowe
Producent/ Dystrybutor	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. **Lek Acard 150 mg stosuje się:** w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; w świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; po przebytych epizodach niestabilnej choroby wieńcowej; w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca; po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwionego udaru mózgu oraz po ich przebyciu; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych; w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; w zapobieganiu zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych. Decyzję o podjęciu leczenia i zastosowanej dawce leku podejmuje lekarz. Substancja czynna: acidum acetylsalicylicum **Skład** Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletki dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Pozostałe składniki to: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, Acryl Eze-White (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan), trietylu cytrynian, symetykon emulsja. **Zawartość** Tabletki leku Acard 150 mg są barwy białej lub prawie białej, okrągłe, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni. Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 tabletek dojelitowych. **Sposób przechowywania** 25°C