

Tadalafil Maxigra 10 mg 2 tabletki



Cena: 42,14 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tadalafilum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Tadalafil Maxigra Tadalafil działa szybko, pierwsze efekty działania możesz zauważyć już po 16-30 minutach od zażycia leku (udane erekcje po kilkunastu minutach występują u części mężczyzn¹, zazwyczaj potrzebny czas wynosi pół godziny), maksymalne stężenie w osoczu krwi tadalafil osiąga po 2 godzinach (wtedy jego działanie jest pełne). Tadalafil Maxigra działa też długo, bo do 36 godzin od zażycia tabletki umożliwiając satysfakcjonujące odbycie stosunku z partnerką. **Dawkowanie** 1 tabletkę, co najmniej pół godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Lek możesz stosować raz w tygodniu. W przypadku potrzeby częstszego stosowania produktu leczniczego Tadalafil Maxigra, należy skonsultować się z lekarzem, który może rozważyć przyjmowanie mniejszej dawki raz na dobę. **Skład** Jedna tabletkę zawiera Tadalafil (Tadalafilum) 10 mg - substancja czynna Substancje pomocnicze - rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, poloksamer typ 188, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokryształiczna, powidon K 30, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172). **Kiedy nie stosować leku Tadalafil Maxigra?** Przebyty udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy Przebyty w ciągu ostatnich 90 dni zawał serca Ciężka choroba serca (co najmniej 2 stopnia wg klasyfikacji NYHA) Niekontrolowane niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze Niekontrolowane zaburzenia rytmu serca Jednoczesne stosowanie innych leków na zaburzenia rytmu serca (np. sildenafil), inny lek na erekcję możesz przyjąć dopiero po upływie 48 godzin od zastosowania produktu leczniczego Tadalafil Maxigra Jednoczesne stosowanie leków z doksazosyną (tadalafil może nasilić działanie doksazosyny prowadząc do niedociśnienia i omdleń), jeśli stosujesz lek z doksazosyną skonsultuj się ze swoim lekarzem. Stosowanie leków z grupy azotanów (np. Nitrocard, Sustonit, Effox, Sorbonit, Pentaerythritol, Galpent)