

Valerin Max 10 tabletek



Cena: 19,65 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,36 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent/ Dystrybutor	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Valerianae radicis extractum siccum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Valerin MAX Valerin max to lek roślinny o działaniu uspokajającym. Jako jedyny na rynku zawiera maksymalną dawkę wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego – 360 mg*. Przywraca równowagę i panowanie nad sobą, a jednocześnie pozwala normalnie funkcjonować.

Skład Jedna tabletki powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka, suchego (Valerianae radix extractum hydroalcoholicum siccum, 8-11:1) w połączeniu z nośnikami (30%). Nośnikami są: maltodekstryna i krzemionka koloidalna bezwodna. Ekstrahent: etanol 60% (v/v). Substancje pomocnicze: w tym laktoza. **Wskazania** łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju **Dawkowanie i sposób podawania** Podanie doustne. Dorośli: 1 tabletki do 3 razy na dobę. **Przeciwwskazania** Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami i obsługujące maszynami i u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Valerin max, kozłek lekarski 360 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych; u dzieci poniżej 12 lat. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn: Produkt leczniczy może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, dlatego też nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami lub innymi maszynami. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.