

Dicopeg Junior 30 saszetek



Cena: 72,15 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	30 sasz.a 5g
Postać	pr.do p.zaw.doust.
Producent/ Dystrybutor	VITIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Macrogolum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

SkładnikiSkład: makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.

WskazaniaDicopeg Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.Dicopeg Junior ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego.**Działanie**Dicopeg Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.Od 6. miesiąca życia!**Zalecana dzienna porcja do spożycia**Zalecane dawkowanie (Dicopeg Junior 100 g): Od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 0,8 g produktu na kilogram masy ciała dziennie Od 2 do 11 roku życia (od 12 kg do 20 kg): 1 g produktu na kilogram masy ciała dziennie Powyżej 11 roku życia (lub > 20 kg): 10-30 g produktu dziennieDawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Najodpowiedniejszą dawkę dzienną dla osoby z danej grupy wiekowej ustala się na podstawie masy ciała dziecka i stopnia zaparcia. Zaleca się w tym celu skonsultować z lekarzem. Przed podawaniem produktu małym dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj największa potrzebna dawka dzienna nie przekracza 30 g produktu.Sposób stosowania (proszek): dozownikiem, na którym zaznaczone są dawki: 0,5 g (pierwsza kreska), 1 g (druga kreska), 2 g (pełna miarka) odmierzamy zalecaną? dzienną? dawkę? produktu. Pełny dozownik (2 g) należy rozpuścić w około 1/4 szklanki wody (25 ml) i wypić sporządzony roztwór. Dawkę? dzienną? można zażywać w kilku podaniach. Produkt rozpuszczony w odpowiedniej ilości wody może być przechowywany w lodówce maksymalnie przez 24 godziny.Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu od posiłków.