PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Senefol 0,3 g 60tabl.

Cena: 18,64 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,3 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	60 tabl. (pojemnik)
Postać	tabl.
Producent/ Dystrybutor	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Sennae folium
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Nazwa: Senefol
Postać: tabl.
Dawka: 0,3 g
Opakowanie: 60 tabl. (pojem.)
Skład:

Sennae folium - Liść senesu - 270 mg Silici dioxydum colloidalle - Koloidalny dwutlenek krzemu - 0,30 mg Solani amylum - Skrobia ziemniaczana ad 300 mg Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6,75 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B.

Działanie:

- glikozydy antranoidowe zawarte w liściach senesu wzmagają perystaltykę jelita grubego, hamują wchłanianie wody, co powoduje zmiękczenie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie. Regularne wypróżnienia zmniejszają dolegliwości hemoroidalne. Działanie przeczyszczające występuje po 6-12 godzin od chwili podania preparatu.

Wskazania:

- w zaparciach nawykowych i atonicznych, a także wynikających z błędów diety, - w celu opróżnienia jelit przed badaniem rentgenowskim oraz innymi badaniami diagnostycznymi, - pomocniczo w dolegliwościach hemoroidalnych w celu uregulowania stolca.

:

nie stosować w przypadku: - niedrożności jelit, - ostrego zapalnego schorzenia jelit, - zapalenia wyrostka robaczkowego, - bólów brzucha

niewiadomego pochodzenia, - nadwrażliwości na sennozydy - w okresie krwawienia miesięcznego.

Działania niepożądane:

- wywołuje biegunkę z możliwością odwodnienia i utraty elektrolitów. Należy zbilansować niedobór wody i elektrolitów.

Interakcje:

- przy dłuższym od zalecanego stosowaniu możliwe jest obniżenie poziomu elektrolitów, zwłaszcza potasu, co może nasilić działanie jednocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych. Straty potasu pogłębia równoczesne stosowanie środków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy, preparatów z kory lukrecji.

Dawkowanie (dorośli):

- 1 tabl. 3 razy dziennie lub 3 tabl. przed snem. - osoby w wieku podeszłym, dzieci i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabl. dziennie przed snem. - preparat popić co najmniej 100 ml (1/2 szklanki) wody. - w przypadku braku efektu terapeutycznego następną dawkę preparatu przyjąć po upływie 12 godzin. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość osobniczą dawkowanie należy rozpocząć od najmniejszej, zalecanej dawki (1 tabl.), którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej.

Dawkowanie (dzieci):

- od 2-12 lat: dawkowanie określa lekarz pediatra (w zależności od masy ciała od 0,5 do 1,5 tabl. dziennie przed snem).

Uwagi:

- decyzję o stosowaniu u dzieci do lat 12 oraz przez okres dłuższy niż 7-10 dni może podjąć lekarz. - decyzję o stosowaniu w okresie ciąży i karmienia może podjąć lekarz.