

Sinulan Rinse - zestaw uzupełniający 30 saszetek

Cena: 23,11 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	30 sasz.
Postać	saszetki
Producent/ Dystrybutor	STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Sinulan Rinse to zestaw uzupełniający do płukania zatok, który zawiera rozpuszczalny chlorek sodu do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu przeznaczonego do płukania nosa i zatok. Preparat Sinulan Rinse stosowany jest w prewencji i objawowym leczeniu nosa i zatok, głównie w przypadku: zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, katarze o różnym podłożu, w higienie nosa i zatok. Wyrób medyczny przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 4 roku życia. Działanie Sinulan Rinse udrażnia i oczyszcza nos oraz zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji. **Skład** Chlorek sodu **Sposób użycia** Płukanie przeprowadzić 1-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza. W celach profilaktycznych stosować 2-3 razy w tygodniu. W celu sporządzenia roztworu izotonicznego należy 1 saszetkę (2,16 g) rozpuścić w 240 ml (do poziomu oznaczonego linią na butelce) przegotowanej wody o temperaturze około 36,6°C. W celu sporządzenia roztworu hipertonicznego należy rozpuścić 2 saszetki w 240 ml (do poziomu oznaczonego linią na butelce) przegotowanej wody o temperaturze około 36,6°C. Należy dokładnie zakręcić butelkę i wstrząsnąć aż do rozpuszczenia soli. Przyłożyć końcówkę butelki do otworu nosowego. Oddychać ustami. Ścisnąć butelkę płynnie tak, aby połowa roztworu dostała się do nosa i wydostała drugim otworem nosowym. Po chwili powtórzyć czynność w drugim otworze nosowym przy użyciu pozostałego roztworu. Nie połykać roztworu. Po płukaniu delikatnie wydmuchać nos. Niewykorzystany roztwór wylać. Po każdym użyciu należy umyć butelkę. Używać jedynie oryginalnych i czystych elementów zestawu Sinulan Rinse. Zawsze używać świeżo przygotowany roztwór. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie butelki przez jedną osobę. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody. **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu. Nie stosować w przypadku otwartych, niegojących się ran w nosie, w szczególności po operacjach. Zestawu nie powinny używać osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Nie stosować w przypadku problemów z równowagą lub w sytuacji występowania poważnego krwawienia z nosa. Po operacjach laryngologicznych, przed użyciem skonsultować się z lekarzem. W przypadku chorób objawiających się zwężeniem dróg oddechowych (np. astma, zapalenie oskrzeli itp.) przed zastosowaniem wyrobu należy skonsultować z lekarzem. W razie jakichkolwiek pytań lub gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na saszetce oraz na opakowaniu zewnętrznym oraz gdy opakowanie lub którakolwiek część zestawu jest uszkodzona. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.