

Metafen 20 tabletek



Cena: 24,20 pln

Opis słownikowy

Dawka	200mg+325mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum, Paracetamolum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Metafen to połączenie działającego ośrodkowo paracetamolu oraz charakteryzującego się obwodowym mechanizmem działania ibuprofenu w jednym produkcie leczniczym. To połączenie dwóch substancji o różnych mechanizmach działania przeciwbólowego. **Skład** Substancje czynne leku to ibuprofen (Ibuprofenum) i paracetamol (Paracetamolum). 1 tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu. Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Metafen należy przyjmować po posiłku. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, lub gdy konieczne jest stosowanie leku przez okres dłuższy niż 3 dni. **Działanie** Paracetamol i ibuprofen wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. **Wskazania** Lek Metafen stosuje się w bólar różnego pochodzenia takich jak bóle głowy, migrena, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, bóle kości i stawów, bóle pourazowe. **Podmiot odpowiedzialny** Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański **Ważne informacje** To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.