


Ibuvit D3 Kids 15000 IU krople doustne 10 ml



Cena: 29,83 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|--|
| Dawka | 15 000 I.U./ml |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 10 ml |
| Postać | krople doustne |
| Producent/ Dystrybutor | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Vitaminum D |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Charakterystyka Ibuvit D3 Kids to produkt leczniczy w postaci kropli doustnych zawierających witaminę D3. Jedna kropla leku zawiera 500 IU witaminy D3. Jest przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych. **Skład** Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D3). Każdy ml (około 30 kropli) roztworu zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum) - witaminy D3. Każda kropla zawiera około 500 IU cholekalcyferolu. Substancje pomocnicze: Triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W profilaktyce niedoborów witaminy D3 i stanów wynikających z niedoboru. U noworodków i niemowląt lek powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. Noworodki i niemowlęta (do ukończenia 1. roku życia): 500 IU (1 kropla) Ibuvit D3 Kids należy podawać doustnie. W celu łatwiejszego odmierzania kropli, butelkę należy trzymać pionowo. Lek Ibuvit D3 Kids najlepiej przyjmować podczas posiłku. **Działanie** Witamina D3 uczestniczy w wielu procesach dotyczących transportu i wchłaniania wapnia i fosforanów w organizmie. Pobudza prawidłowe tworzenie i mineralizację kości. **Wskazania** Ibuvit D3 Kids jest przeznaczony do stosowania w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z jej niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków. Produkt leczniczy stosowany jest w leczeniu wspomagającym osteoporozy u osób dorosłych oraz w porozumieniu z lekarzem w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią. **Przeciwwskazania** Leku nie należy stosować w przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemii, hiperkalcynurii, kamicy nerkowej, zwapnienia nerek, ciężkiej niewydolności nerek, hiperwitaminozy D, sarkoidozy.

Galeria

| Wiek | Ilość jednostek na dozę | Ilość kropli na dozę |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Dościwiekowy od 1 do 4 lat | 500 IU | 1 kropla |
| Dościwiekowy od 4 do 5 lat | 500 - 1000 IU | 1 - 2 krople |
| Młodzień (w wieku od 11 do 18 lat) | 1000 - 2000 IU | 2 - 4 krople |
| Dorośli | 1000 - 2000 IU | 2 - 4 krople |
| Osoby powyżej 75 lat | 2000 - 4000 IU | 4 - 8 kropli |