

Acard 75 mg 120 tabletek dojelitowych

Cena: 46,22 pln



Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Dawka | 0,075 g |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 120 tabletek |
| Postać | tabletki dojelitowe |
| Producent/ Dystrybutor | WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Acidum acetylsalicylicum |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Lek Acard 75 mg, w postaci tabletek dojelitowych zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. **Wskazania** Lek Acard stosuje się w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; w świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu świeżego zawałowi serca; w niestabilnej chorobie wieńcowej; w zapobieganiu powtórному zawałowi serca; po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwionego udaru mózgu oraz po ich przebyciu; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych; w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; w zapobieganiu zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwanie unieruchomionych. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acard. Lek Acard dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania. **Stosować doustnie** Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletki (75 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletki dojelitowe leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka. W świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu świeżego zawałowi serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. Uwaga: w ostrym zawałowi serca lub podejrzeniu ostrego zawałowi serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych. **Substancja czynna:** acidum acetylsalicylicum **Skład** 1 tabletki zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75mg oraz substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczką: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.