

Starazolin HydroBalance PPH krople do oczu 3 x 5 ml



Cena: 37,54 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	15 ml (3x5)
Postać	krople do oczu
Producent/ Dystrybutor	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Starazolin HydroBalance PPH w postaci kropli do oczu to lek, który wykazuje skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynosi szybką ulgę przy odczuwaniu suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia piasku pod powiekami. Preparat **Starazolin HydroBalance PPH** jest szczególnie wskazany w przypadku: - narażenia narządu wzroku na działanie drażniących czynników środowiskowych takich jak: kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (centralne ogrzewanie, sauna), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki, chlorowana woda; obniżonej częstości mrugania spowodowanej oglądaniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagających długotrwałej koncentracji wzroku min. długotrwała praca przed ekranem monitoru, prowadzenie samochodu itp.; - zbyt małej ilości łez lub zmiany ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia; - osób noszących soczewki kontaktowe. - Krople Starazolin HydroBalance PPH mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów. Sterylne - wyprodukowano w warunkach aseptycznych. **Działanie** Krople **Staralozin HydroBalance PPH** wykazują skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynoszą szybką ulgę w odczuwaniu suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu, oraz uczucia piasku pod powiekami. **Skład** Hialuronian sodu, chlorek sodu, kwas borowy, tetraboran sodu, edetynian disodu, poliheksanid (PHMB), woda wysokooczyszczona. **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia**- Krople należy stosować miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje się 1-2 krople, 3-5x/dobę. - Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki. - Jeżeli po usunięciu czynników drażniących, objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania kropli, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem specjalistą.